PROGRAMA DE ACTOS

08:00 h.- Salida tradicional con ganado. Nos trasladaremos desde el casco del Municipio hasta las medianías por el camino que utilizaban los antiguos labradores en la época de siembra. Partiremos a las 8 de la mañana desde la Cantonera (Concentración de animales desde las 07:00 h.).

09:15 h.- Tradicional ordeño y desayuno.

10:15 h.- Desarrollo de las actividades.

- Siembra de las medianías mediante arado de la tierra con yunta de vaca.

- Exhibición de tareas domésticas: lavado de ropa en la acequia, etc...

- Suelta de palomas y exhibición de aves rapaces.

11:30 h.- Intervención de D. Rafael Sánchez Valerón. El Cronista Oficial de la Villa nos ofrecerá una charla explicativa acerca de la diversidad de aves existentes en nuestra zona de Medianías.

12:00 h.- Exhibición y muestra de aves.

12:15 h.- Brindis para todos los asistentes.

- Se podrán degustar diversas comidas típicas canarias.

Elaboración y degustación de postres tradicionales.
Taller de elaboración del queso artesanal.

COLABORAN:

- Asociación de Vecinos "La Hoyeta".
- Parranda "El Ratiño".
- Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio.

- Aguas El Toscal.

X JORNADAS DE AMBIENTACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESCATE DEL PATRIMONIO RURAL DE LAS MEDIANÍAS DE INGENIO (Área Recreativa "El Ratiño"



Avifauna de Medianías y Cumbres de Ingenio







AVIFAUNA DE MEDIANÍAS Y CUMBRES DE INGENIO

La avifauna de la "medianía del Ingenio" se enmarca en el ecosistema del piso basal (cardonal-tabaibal) y bosque termófilo (cuencas de los barrancos de Guayadeque, Sierra, Castil y Draguillo).

La presencia de aves, especialmente pájaros en nuestras medianías, constituía un especial atractivo en la época de zafra (Marzo-Mayo), alegrando los campos con sus variados trinos y anidación, causando admiración los que tenían un especial y melodioso canto (calandros, canarios, pintos y capirotes) o por su colorido (mistos o fraileros), siendo rechazados los silenciosos (alfarritas y chilinas); eran odiados por distintas causas el "alcairón" o el cuervo por una extraña leyenda, y "palmeros" y mirlos por su voracidad; la "alpispita" gozaba de una especial veneración y el alcaraván resultaba especialmente curioso por su fisonomía, vuelo, nido y onomatopéyico canto: "tíoluistíoluis". Algunos tienen un nombre diferenciado en la zona, caso de "rajoneros", "fraileros", "alfarritas" o "chilinas".

Desde la época del abandono de las actividades agrarias en nuestras medianías (década de 1960), por distintas causas: años secos con la desaparición de alimento, fuentes y bebederos, caza indiscriminada con redes y pegamento, empleo de insecticidas, desequilibrio depredador-presa y la descontrolada antropización, gran parte están casi extinguidos y otros han cambiado su hábitat natural. Los "bandos" de moros, calandros, trigueros y pintos es una imagen que se pierde en el tiempo.

Debemos considerar que la mayoría son especies y subespecies autóctonas y por tanto protegidas. Sirvan estas Jornadas para inculcar el debido respeto y protección a las aves por ser un elemento más que caracteriza nuestros campos, por su interés científico, belleza, armonía de sus trinos y el natural instinto de alimentación y depredación.

Rafael Sánchez Valerón Cronista Oficial de Ingenio

NOMBRE	LOCAL	TAMAÑO	NIDOS	PUESTA	ESTADO
Abubilla	Alpupú	28 cm.	Oquedades	2 a 4	Escaso
Alcaraván	Tío Luis	41 cm.	Suelo	2	Muy escaso
Alcaudón Real	Alcairón	24 cm.	Arbustos	3 a 5	Escaso
Alimoche	Guirre	58-68 cm.	Acantilados	2	Extinguido
Bisbita caminero	Chilina	15 cm.	Suelo	4 - 5	Abundante
Búho Chico	Búho	34 cm.	Acantilados	2 a 4	Escaso
Camachuelo Trompetero	Moro	13 cm.	Suelo	4	En recesión
Canario	Canario Monte	12,5 cm.	Arbustos	3 a 5	Escaso
Cernícalo vulgar	Cernícalo	33-35 cm	Acantilados	4	Abundante
Codorniz	Alcorniz	18 cm.	Suelo	7a9	Escaso
Cuervo	Cuervo	62 cm.	Acantilados	3 a 6	En recesión
Curruca cabecinegra	Capirote de ojos colorados	13 cm.	Arbustos	2 a 4	Escaso
Curruca capirotada	Capirote	14 cm.	Arbustos	3 a 4	Abundante
Curruca tomillera	Alfarrita	12 cm.	Arbustos	4 a 5	En recesión
Gorrión Chillón	Rajonero	14 cm.	Oquedades	3 a 5	En recesión
Gorrión moruno	Palmero	14,5 cm.	Lugares altos	4a6	Abundante
Herrerillo común	Frailero	11-12 cm.	Oquedades	3 a 5	Abundante
Jilguero	Pinto	12 cm.	Arbustos	4 - 5	En recesión
Lavandera cascadeña	Alpispa	18 cm.	Humedales	3 a 5	Escaso
Lechuza común	Lechuza	34 cm.	Acantilados	2 a 4	Escaso
Mirlo común	Mirlo	25 cm.	Arbustos	2 a 3	Abundante
Mosquitero común	Hornero	10 cm.	Arbustos	3 a 4	Abundante
Paloma bravía	Paloma salvaje	33 cm.	Acantilados	2	Abundante
Pardillo común	Misto, Linacero	13 cm.	Arbustos	3 a 5	En recesión
Perdiz común	Perdiz	34 cm.	Suelo	10 a 15	Escaso
Ratonero Común	Aguililla	51-56 cm.	Acantilados	2 a 4	Escaso
Terrera marismeña	Calandro	14 cm.	Suelo	2 a 4	En recesión
Tórtola común	Tórtola	27 cm.	Arbustos	2	Escaso
Triguero	Triguero	18 cm.	Suelo	4 - 5	En recesión
Vencejo	Avullón	15-16 cm.	Acantilados	2	Abundante